

FÖRVARING

- Aranesp® förvaras vid 2 °C till 8 °C (i kylskåp) och får inte frysas.
- Aranesp® är ljuskänsligt och ska förvaras i originalförpackningen.
- När en spruta har tagits ut ur kylskåpet och antagit rumstemperatur (högst 25 °C) måste den användas inom 7 dagar.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Efter användning skall sprutan kasseras enligt anvisning från apotek eller sjukvårdspersonal.

BIVERKNINGAR

Biverkningar av Aranesp® som högt blodtryck, smärta vid injektionsstället och överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

Dessa biverkningar är vanligtvis övergående men om något av symtomen kvarstår ska du tala om det för din läkare eller sjuksköterska.

Aranesp® (darbepoetin alfa) R_{xs} (F) injektionsvätska, lösning
förfylld spruta 10 – 500 µg samt injektionspennor 20, 40, 60, 80, 100, 150, 300 samt 500 µg. ATC kod: B03XA02.

Indikationer: Behandling av symptomgivande anemi hos vuxna och barn med kronisk njursvikt (CRF). Behandling av symptomgivande anemi hos vuxna cancerpatienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi.

Kontraindikation: Använd inte Aranesp® vid otillräckligt kontrollerad hypertoni (högt blodtryck). Biverkningar av Aranesp® som högt blodtryck, smärta vid injektionsstället och överkänslighetsreaktioner kan förekomma.

För mer information läs alltid bipacksedeln som medföljer förpackningen alternativt online på FASS allmänhet (www.fass.se) Datum för översyn av bipacksedel: februari 2021. www.amgen.se


SWE-291-0223-80002 Feb 2023



Amanesp®
(darbepoetin alfa)

Patientinformation

får endast distribueras via vårdpersonal



AMGEN®

Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 Solna,
08 - 695 11 00, www.amgen.se



VAD ÄR ANEMI?

Doktorn säger anemi och på vardagssvenska kallas det blodbrist.

Två ord för samma sak, nämligen brist på röda blodkroppar. I den röda blodkroppen finns det röda färgämnet hemoglobin. Det är hemoglobinet som ger blodet dess röda färg och som transporterar syre till kroppens vävnader. Om blodet har för låg halt hemoglobin minskar förmågan att transportera syre till t ex muskler och hjärnan. Symtomen som därvid uppträder är trötthet, sänkt koncentration förmåga och muskelsvaghet.

Njuren deltar aktivt i bildningen av röda blodkroppar genom att producera ett hormon som kallas erytropoietin. Vid avancerad njursjukdom uppstår brist på detta hormon. Detta är den viktigaste orsaken till att njursvikt ger upphov till anemi. Anemi konstateras genom ett vanligt blodprov som kontrollerar hemoglobinhalten (Hb-värdet) i blodet.


DIN LÄKARE HAR ORDINERAT ARANESP® FÖR BEHANDLING AV ANEMI

Aranesp® verkar på samma sätt som det naturliga hormonet erytropoietin och tas vanligtvis 1-4 gånger per månad.

Vid behandling med Aranesp® kan det ta upp till 4 veckor innan Hb-värdet stiger och du känner dig piggare.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU ARANESP®

1. LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING



📌 Lyft sprutan enligt bilden.

2. FÖRBEREDELSE FÖR INJEKTION

Ta ut den förfyllda sprutan ur kylskåpet. Låt den ligga framme ca 30 minuter då injektionen känns behagligare om injektionsvätskan är rumstempererad.


OBS! Skaka inte den förfyllda sprutan.

Tvätta händerna!

Kontrollera utgångsdatum och se efter så att injektionsvätskan är klar och färglös eller svagt pärlemorskimrande (om den är grumlig eller innehåller partiklar ska den inte användas).

Du behöver inte avlägsna luftbubblor före injektion.

Lämpliga injektionsställen är magen, dock ej närmare än 5 cm från naveln, eller högst upp på lårens framsida. Utsidan av överarmen (endast om någon annan ger injektionen).



A Ta bort den grå nålhylsan.

📌 Nyp ihop huden så att den hålls spänd under hela injektionen. Fortsätt att nypa ihop huden. STICK IN nålen i huden.



B TRYCK kolven långsamt med ett jämnt tryck tills du känner eller hör ett "KLICK". Tryck hela vägen genom klicket.

📌 Det är viktigt att trycka genom "KLICKET" för att hela dosen ska injiceras.



C SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.

Efter att ha släppt kolven kommer nålskyddet att täcka nålen.